



NUTRI-BIOMED

ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.
HELLAS L.T.D.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

NUTRITIONAL - BIOLOGICAL & PHARMACEUTICAL PRODUCTS

DOXYCYCLINE NBM

Υδατοδιαλυτή σκόνη

ΣΥΝΘΕΣΗ:

Ανά γραμμάριο του προϊόντος: Doxycycline hyclate 500 mg
Citric acid, Lactose.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

Λοιμώξεις που προκαλούνται από βακτήρια ευαίσθητα στη δοξυκυκλίνη. Ειδικότερα συνιστάται:
Μόσχοι (πριν την έναρξη λειτουργίας της μεγάλης κοιλίας): Βρογχοπνευμονία και πνευμονία
Χοίροι: Ατροφική ρινίτιδα και βρογχοπνευμονία
Πτηνά (ορνίθια): Λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος και εντερίτιδες

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

Να μη χορηγείται σε ζώα με γνωστή υπερευαισθησία στις τετρακυκλίνες. **Να μη χορηγείται σε ωτόκες όρνιθες, τα αυγά των οποίων προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.**

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

Αντιδράσεις υπερευαισθησίας. Όπως συμβαίνει με όλα τα αντιβιοτικά που χορηγούνται από το στόμα, είναι δυνατό να προκληθεί διάρροια μετά το τέλος της χορήγησης.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:

Μόσχοι (πριν από την έναρξη λειτουργίας της μεγάλης κοιλίας):

Γενικά χορηγείται στη δοσολογία των: 10 mg δοξυκυκλίνης / kg σωμα. βάρους, ημερησίως.
Η συνολική δόση διαιρείται (ανάλογα με τον αριθμό των γευμάτων) και διαλύεται στο γάλα.
Χορηγείται έτσι 1g DOXYVETO ανά 50kg σωματικού βάρους, ημερησίως.

Χοίροι:

Γενικά χορηγείται στη δοσολογία των: 10 mg δοξυκυκλίνης / kg σωμα. βάρους ημερησίως, μετά από διάλυση στο πόσιμο νερό. Χορηγούνται έτσι 200g DOXYVETO ανά 1000 Lt πόσιμου νερού.

Πτηνά (ορνίθια):

Γενικά χορηγείται στη δοσολογία των: 20 mg δοξυκυκλίνης / kg σωμα. βάρους ημερησίως, μετά από διάλυση στο πόσιμο νερό. Χορηγούνται έτσι 300g DOXYVETO ανά 1000 Lt πόσιμου νερού.

Διάρκεια αγωγής: 3-5 ημέρες.

Πριν από την προσθήκη του προϊόντος στο πόσιμο νερό, θα πρέπει να γίνεται καλή διάλυσή του σε χλιαρό νερό. Το υποκατάστατο του γάλακτος πρέπει να ψύχεται πριν από την προσθήκη του διαλύματος.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ:

Μόσχοι: 14 ημέρες - Χοίροι: 8 ημέρες - Πτηνά: 9 ημέρες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ:

Φυλάσσετε σε θερμοκρασία δωματίου (<25°C) και προστατευμένο από το φως.
Μετά τη διάλυσή του στο πόσιμο νερό, το προϊόν παραμένει σταθερό για 24 ώρες, σε θερμοκρασία δωματίου (15-25°C). Μετά τη διάλυση του προϊόντος στο γάλα, το διάλυμα που προκύπτει θα πρέπει να καταναλώνεται αμέσως.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

100g και 1kg.

ΑΡΙΘ. ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 26337/18-04-2008